

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 27. december 2018	Gælder til:

Anbefalinger

- Ved akut colonileus bør der, hvis muligt, foretages CT-skanning af abdomen med i.v. kontrast. B
- Behandling af colonileus bør om muligt foregå i dagtiden og med deltagelse af kolorektalkirurg. B
- Der anbefales aflastning på alle patienter, der ikke har fået foretaget operabilitets- og resektabilitetsvurdering forud for indgrevet. D
- Ved colonileus er følgende behandlingsmodaliteter ligeværdige mht. overlevelse: Anlæggelse af stent, anlæggelse af aflastende stomi samt resektion med eller uden primær anastomose. A
- Ved palliativ behandling af colonobstruktion er aflastning med stent førstevælg, hvor teknisk muligt. B

Ansvarlige

Uffe Schou Løve, overlæge, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Regionshospitalet Viborg.

Tue Højslev Avlund, afdelingslæge, Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Herning.

Mekanisk colonileus og -obstruktion

Mekanisk ileus som debutsymptom ses hos ca. 14pct. af danske KRC patienter jf. tidligere DCCG årsrapporter og stemmer overens med, hvad der ses i andre lande. Venstresidig colonobstruktion er hyppigst forekommende og udgør ca. 70pct. af alle med colonileus [1] [2A].

Ved komplet obstruktion er der tale om manifest colonileus.

Risikoen for perforation af coecum ved colonileus stiger ved radiologisk fund af coecums diameter ≥ 12 cm, og akut aflastning anbefales [2] [5].

Diagnosen colonileus kan stilles ved CT-oversigt med en høj sensitivitet (91pct.) og specificitet (91pct.) [3] [2B]. CT-oversigt kan identificere den anatomiske lokalisering af obstruktionen og vurdere sværhedsgraden af ileus ud fra coecums diameter. CT-scanning med intravenøs kontrast kan herudover ofte aklare årsagen til ileus, påvise evt. tegn på iskæmi, og tumorstadiet kan fastlægges. Herved kan behandlingsstrategien og dens timing planlægges mere effektivt [4] [4]. CT-scanning kan suppleres med rektal indhældning med vandig kontrast, hvorved komplethedden af

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 27. december 2018	Gælder til:

stenosen kan afklares nærmere. CT-scanning synes derfor at være konventionel røntgenindhældning overlegen [5] [2B].

Behandlingsstrategien ved obstruerende coloncancer er afhængig af bl.a. den kliniske tilstand og lokalisering af den obstruerende tumor. Behandlingsmodaliteterne udgøres af aflastning med stent eller stomi, akut operation, herunder resektion, og i sjældne tilfælde damage control surgery.

Akut operation for coloncancer er i Danmark fortsat forbundet med en ganske høj 30- og 90-dages mortalitet. I 2016 var denne henholdsvis 11,3 pct. og 21,1 pct. [6] [2C]. Ved akut resektion er såvel morbiditet som mortalitet højere sammenlignet med elektiv resektion [7] [2B] og med højere risiko for kolostomianlæggelse [8] [1B]. I behandlingen af akut colonobstruktion, uden perforation, synes det derfor ønskeligt at konvertere fra akut til elektiv operation, hvilket også vil muliggøre stadieinddeling. Herved kan patienter med metastaserende cancer uden tegn på perforation skånes for et operativt indgreb.

Behandling af colonileus bør om muligt foregå i dagtiden og med deltagelse af en kolorektalkirurg. Morbiditet, mortalitet og anastomoselækageraten er sandsynligvis højere, når operationen foretages af en kirurg uden subspecialisering i kolorektal kirurgi [9, 10 - 15] [2A-B]. Langtidsoverlevelse efter akut kolorektal resektion for cancer er sandsynligvis også relateret til kirurgens subspecialisering [12,15] [2A].

Aflastning med stent

Der er et stort antal af publikationer, som omhandler kortidsresultater ved anlæggelse af selvekspanderende metalstent i colon. I en metaanalyse fra 2017 omfattende 448 patienter fra 7 randomiserede og retrospektive studier, hvor stentanlæggelse som bridge to surgery og akut colonresektion for venstresidig coloncancer blev sammenlignet, havde stentgruppen lavere rate af permanente stomier og lavere morbiditet. Patienter, der fik primær anastomose i stentgruppen, udgjorde 71,7 pct. mod 55,3 pct. ved akut resektion (RR 1.27 95pct.CI (0.98 – 1.64). Der fandtes ingen forskel i mortalitet eller anastomoselæk [16] [1A]. Denne metaanalyse viste teknisk og klinisk succesrate af stentanlæggelse på henholdsvis 79 pct. og 75 pct., Teknisk succesrate varierer i litteraturen mellem 47-100 pct. Tilsvarende resultater rapporteres fra andre metaanalyser af randomiserede studier [17,18,19,20] [1A].

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 27. december 2018	Gælder til:

I et retrospektivt studie, der sammenlignede stent med aflastende stomianlæggelse, fandt man økonomisk besparelse og kortere indlæggelsestid i stentgruppen, men ingen forskel i klinisk succesrate [21] [3B].

Der er i litteraturen beskrevet varierende rater af tarmperforation i forbindelse med stentanlæggelse [22-27] [1B]. Stentrelaterede komplikationer blev ifølge en Cochrane metaanalyse beskrevet som acceptable (stentrelateret perforation 5,8 pct., stentmigration 2,1 pct. og stentobstruktion 2,1 pct.) [28] [1A]. Et nyere dansk studie har angivet en stentperforationsrate på 8,9 pct. [29] [2B].

De fleste stentrelaterede perforationer har været beskrevet i de første dage efter anlæggelsen [19] [1A]. Perforationen opstår ofte på grund af selve stentindføringen eller forudgående ballondilatation af strikturen. Der kan være tumornær perforation eller perforation af det dilaterede tarmsegment oralt for tumoren [27] [2A]. Risikoen er muligvis ikke relateret til typen af stent [29] [2B]. I en systematisk gennemgang af 82 studier (2287 patienter) kunne Datye et al [30] [3A] ikke vise signifikant forskel i perforationsraten mellem stent som palliation eller bridge to surgery. Den totale perforationsrate var 4,9 pct., hvoraf ca. halvdelen skete i det første døgn. Risikofaktorer for perforation var kemoterapi, stråleterapi og steroider. Mortalitet blandt patienter med perforation var 16,2 pct. Graden af obstruktion bør tages i betragtning ved analyse af perforationsrisiko. I en retrospektiv opgørelse med 130 patienter rapporteres, at perforationsraten er associeret med vinklingen af stenosen [31] [2B], et forhold som også bør tages i betragtning inden stentanlæggelse. Tre randomiserede studier beskrev i 2008 og 2011 asymptotisk perforationsrate mellem 6 – 27 pct. [22,26,32] [1A], hvilket har øget bekymringerne om langtidsresultaterne ved behandling med stent som bridge to surgery.

En vellykket stentanlæggelse stiller store krav til både teknisk færdighed, apparatur og organisation - især i den akutte situation. Behandlingen bør derfor kun udføres på afdelinger, som besidder dette set-up. På den enkelte afdeling bør stentbehandling holdes på få hænder af hensyn til opretholdelse af rutinen. Lee et al. [33] [3B] har beskrevet en learning curve efter at have analyseret resultater af stentbehandling hos 120 patienter udført af en enkelt endoskopør. Den tekniske og kliniske succesrate steg, og komplikationer faldt i takt med stigende antal procedurer. De konkluderede, at en erfaren endoskopør kunne udføre stentanlæggelse mere effektivt efter 30 procedurer. I et

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 27. december 2018	Gælder til:

retrospektivt dansk studie [34] [2B], hvor proceduren blev udført eller superviseret af en erfaren kolorektal kirurg, rapporteres høj teknisk og klinisk succesrate, henholdsvis 100 pct. og 88 pct.

Anlæggelse af stent oralt for venstre fleksur er traditionelt blevet frarådet ud fra den betragtning, at det er teknisk mere vanskeligt end stenting af venstresidige tumorer. Nyere retrospektive studier viser dog ens morbiditet og mortalitet for anlæggelse af højresidige stent versus akut operation, samtidig med lavere frekvens af stomianlæggelser [35] [3B], og den kliniske succesrate for stentanlæggelsen var over 90 pct.

Et systematic review fra 2015 omhandlende 14 cohortestudier fandt samlet mindre morbiditet og mortalitet ved stenting frem for akut resektion af akut højresidig colonobstruktion og ligeledes lavere frekvens af stomianlæggelser [36] [2A].

Stenting af colontumorer oralt for venstre fleksur kan således foretages på centre hvor ekspertisen haves.

Aflastning med stomi

Aflastning af tarmen i den akutte situation kan også gøres med stomi som en initial procedure ved colonileus. I det randomiserede danske studie fra 1995 med aflastende stomi versus akut resektion var der samme mortalitet i grupperne, men længere indlæggelsestid i stomi-gruppen [37] [1B]. En metaanalyse af 8 studier, der sammenligner aflastende stomi mod akut operation, fandt ingen forskel i 30-dages morbiditet eller mortalitet, som var omkring 7 pct. for begge grupper, men der var færre permanente stomier i gruppen med aflastende stomi [38] [2A]. Grundet bekymringer for langtidsresultaterne på stent som bridge to surgery er der kommet fokus på denne behandling de senere år. Et cohortestudie fra 2016 med sammenligning af stent og stomi som aflastning før resektion fandt færre indgreb og lavere langtidsmorbiditet (primært grundet hernierung) i stentgruppen [39] [2B]. Stomianlæggelse har stadig en plads i den akutte behandling af mekanisk colonileus, især ved mislykket stentanlæggelse, manglende ekspertise eller hos patienter med svær komorbiditet [40] [2A]. Chéreau et al. [41] [2B] har publiceret et retrospektivt studie af 83 patienter med akut kirurgi for colonileus, hvor 61 patienter havde fået anlagt aflastende sigmoideostomi. Efterfølgende elektiv colonresektion var mulig hos 74 pct. med median 11 indlæggelsesdage og 30-dages mortalitet på 5 pct. Looptransversostomi (i højre side af abdomen og uden deling af kar), eller

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 27. december 2018	Gælder til:

loopileostomi anbefales som alternativ ved stor gennemvokset tumor, hvor neoadjuverende kemoterapi mhp. downstaging ofte er indiceret [42] [2A].

Akut operation med resektion

Der foreligger kun få prospektive opgørelser af metodevalg ved kirurgisk behandling af mekanisk colonileus. Et ældre Cochrane review [43] [1A] kunne ikke påvise forskelle i resultaterne mellem resektion og primær anastomose versus aflastning med stomi og efterfølgende resektion og anastomose.

Der er rapporteret anastomoselækage med en frekvens på 2,5 - 5,2 pct. i retrospektive studier af akut højresidig colonresektion [44,45] [2B].

Ved venstresidig colonobstruktion (akut obstruerende tumorer i eller analt for venstre fleksur) kan der foretages primær resektion med anlæggelse af anastomose forudgået af en peroperativ antegrad skylning eller manual tømning af den dilaterede colon oralt for tumor. Kam et al. viste i deres systematiske gennemgang signifikant højere anastomoselækagefrekvens på 7 pct., hvis der var foretaget antegrad skylning, mod 1 pct. efter manual tømning. Der var signifikant højere 30-dages mortalitet efter antegrad skylning (7,2 pct. versus 1 pct.) [46] [2A]. Hartmanns operation er en foretrukken operativ strategi hos patienter med høj risiko for anastomoselækage [47] [2A].

Kolektomi med samtidig anlæggelse af ileosigmoidal eller ileorektal anastomose kan foretages som et alternativ til en primær resektion med stomi og har en 30-dages mortalitet på under 10 pct. [48] [2B] og en lavere anastomoselækagerate sammenlignet med segmentær resektion [49] [2B]. I den nationale DCCG-rapport fra 2016 rapporteres lækageraten dog på 18 pct. efter akut kolektomi med ileorektal anastomose [6] [2C]. Et ældre randomiseret studie sammenlignede kolektomi og ileorektal/ileosigmoideal anastomose med segmentresektion og peroperativ antegrad skylning [50] [1B] og fandt ingen signifikant forskel i morbiditet og mortalitet.

Ved venstresidig colonileus kan aflastning forsøges enten ved anlæggelse af aflastende (transverso- eller ileo-) stomi eller ved anlæggelse af selvekspanderende metalstent, begge med henblik på evt. senere kurativ kirurgi. Ved fund af dissemineret sygdom kan såvel aflastende stomi som stent være definitiv kirurgisk behandling. Der bør udvises forsigtighed ved anlæggelse af stent i tilfælde af komplet obstruktion – og muligvis ved betydelig vinkling af stenosen.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 27. december 2018	Gælder til:

Ved *højresidig* colonobstruktion (akut obstruerende tumorer oralt for venstre fleksur) uden fækulent peritonit kan højresidig hemikolektomi med primær ileokolisk anastomose foretages.

I Danmark er lækageraten efter akut colonresektion 2,8 pct. ifølge DCCG's årsrapport 2012 [51] [2C] og 30- og 90-dages mortalitet efter akut operation i 2016 var henholdsvis 11,3 pct. og 21,1 pct. [6] [2C]

Et systematisk review fra 2016 af 8 randomiserede studier omfattende i alt 497 patienter [18] [1A] viste 60-dages mortalitet på 9,6 pct. i stentgruppen og 9,9 pct. i gruppen, der modtog akut operation. Morbiditeten var ikke signifikant forskellig. Det primære signifikante fund var lavere rate af både midlertidig stomi og permanent stomi for stentgruppen.

Evidensen er således ikke entydigt med henblik på den optimale tilgang til patienten med akut obstruerende coloncancer. Der er dog bred enighed om, at placering af en selvekspanderende metalstent i øvede hænder, ved en ikke-komplet eller vinklet obstruktion, er en god aflastning i den akutte situation og en god løsning som et palliativt tilbud. Den akutte aflastning med stomi er ikke belyst i samme grad.

De randomiserede studier, som sammenligner stent som bridge to surgery med akut operation, synes at have lavere mortalitet efter den akutte kirurgi end de danske tal fra DCCG antyder. Hertil kommer, at nogle af studierne har inkluderet stentanlæggelser også i tilfælde af komplet obstruktion og i et set-up med begrænset rutine.

Det onkologiske outcome har været en bekymring i form af indicier på, at stentbehandlingen kan påvirke langtidsresultaterne. Der findes dog ikke samlet set signifikante fund på dette.

Usikkerheden i evidensen taler for individuelle løsninger. Fra DCCG's kirurgiske arbejdsgruppe anbefales dog fortsat aflastning, såfremt patientens samlede operabilitet og resektabilitet ikke er vurderet forud for indgrevet, for herved at kunne optimere og vurdere patienten. Metoden for aflastning må afgøres på de enkelte afdelinger, hvor det anbefales at være stringent i forhold til den lokale ekspertise.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 27. december 2018	Gælder til:

Behandling med kurativ intention

Hos patienter uden fjernmetastaser muliggør aflastning præoperativ optimering. Anlæggelse af stent kan ved mikro- eller manifest perforation teoretisk set forringe langtidsprognosen gennem en øget risiko for fjernmetastasering og lokal spredning. I et dansk cohortestudie blev 5-års overlevelse og recidiv sammenlignet for stentbehandlede patienter med og uden perforation. Der fandtes ikke signifikant forskel, men en justeret hazard ratio for mortalitet på 1,6 (95 pct. CI (0.8-3.3.)) ved perforation [52] [2B]. Langtidsresultater fra randomiserede studier foreligger, men peger i forskellige retninger. Sloothaak et al rapporterede i et randomiseret studie fra 2014 en dårligere disease-free survival og overall survival for subgruppen med stentperforation opgjort efter 4 år. Der var dog kun inkluderet 26 patienter til stentbehandling, hvoraf 6 havde perforation, hvorfor resultatet er svært at tolke [53] [1B]. Et randomiseret studie fra 2016 af Arezzo med 144 patienter, hvor stenting og akut kirurgi sammenlignes, har vist ens overall survival og progression-free survival efter 3 år, men resultater efter længere follow-up foreligger ikke [54] [1B].

Et retrospektivt databasestudie af Verstockt fra 2017 af 97 patienter behandlet med stent som bridge to surgery viser uændret 3-, 5- og 10-års overlevelse og sygdomsfri overlevelse sammenlignet med landsgennemsnittet for kolorektalcancer, og også uændret for stentperforationer [55] [2C].

I et større dansk epidemiologisk studie, omfattende 581 patienter med stent som bridge to surgery og 3333 patienter, der blev akut opereret, fandtes ingen forskel på 5-års overlevelsen [56] [2B]. I 2015 fandt en metaanalyse bestående af 11 studier med langtidsresultater mellem stent som bridge to surgery og akut operation ingen forskel på overlevelse eller recidiv [57] [2A]. Et retrospektivt dansk studie af 34 stentbehandlede patienter som bridge to surgery har vist en kumuleret 30-dages mortalitet på 3 pct. og 3-års overlevelse på 74 pct. [34] [2B]. I dette studie blev stentprocedurerne foretaget eller superviseret af erfarne kolorektalkirurger.

Det er derfor, trods mange studier, ikke sikre holdepunkter for, at de onkologiske resultater forværres ved stentanlæggelse. Dog synes undergruppen af patienter med perforation generelt at have dårligere outcome. Studierne er imidlertid små, og der er ikke fundet signifikante forskelle.

Evidensen for aflastende stomi som alternativ er yderst sparsom, hvad angår de onkologiske langtidsresultater.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 27. december 2018	Gælder til:

Et retrospektivt hollandsk studie har dog sammenlignet overlevelse og sygdomsfri overlevelse efter aflastning med stent mod stomi. Efter en medianopfølgning på 36 måneder for stentbehandlede patienter og 29 måneder for stomiaflastede patienter fandtes ingen forskel på overlevelse eller sygdomsfri overlevelse [39] [2B].

Palliativ behandling

Aflastende behandling muliggør stadieinddeling og minimerer det kirurgiske stress. Ved stentbehandling undgår patienter med metastaserede sygdom stomi og forringet livskvalitet forbundet med at have en stomi. Meisner et al. [58] [2B] har i et prospektivt multicenterstudie af stent som palliation demonstreret en teknisk succesrate på 98,4 pct., en klinisk succesrate på 87,8 pct. og lav komplikationsrate (perforation 5,1 pct., migration 5,5 pct.). Mortaliteten var under 2 pct. (to patienter døde, en efter 24 dage, og en efter 34 dage). Perforationsrisikoen synes at være et endnu uafklaret problem. Et hollandsk randomiseret studie, der sammenlignede akut resektion med stent til palliation af mekanisk ileus hos patienter med metastaserende coloncancer, blev stoppet før tid grundet høj frekvens af stentrelaterede perforationer (6 perforationer ud af 11 anlagte stents) [22] [1B].

Især bevacizumab behandling er tidligere rapporteret som en risikofaktor for tarmperforation, og et retrospektivt studie fra 2015 antyder en højere risiko for perforation ved stentbehandling hos patienter i behandling med dette stof [59] [3A].

Det hyppigste problem ved stent som palliation er migration. Stentmigration har en incidens på op til 10,5 pct. [60] [2A]. Migration kan relateres til behandling med pallierende kemoterapi (idet den af behandlingen udløste respons kan resultere i tumorskrumpning), eller til stenttype og -diameter. Migrationsraten forventes at øges i takt med længere overlevelse pga. mere effektiv pallierende kemoterapi. Et studie, der sammenlignede palliativ aflastning med stomi og stent, fandt dog større sandsynlighed for udskrivelse til eget hjem med stentbehandling [61] [2B]. I et randomiseret studie mellem stent og kirurgisk aflastning var indlæggelsestiden kortere og livskvaliteten højere hos stentbehandlede patienter [62] [1B].

Stentbehandling er derfor et anbefalet valg ved pallierende behandling af stenoserende coloncancer.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Litteraturliste - Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 1. november 2018	Gælder til:

1. You-Ben Fan, Ying-Sheng Cheng, Ni-Wei Chen, et al. Clinical application of self-expanding metallic stent in the management of acute left-sided colorectal malignant obstruction. *World J Gastroenterol.* 2006 Feb 7; 12(5):755-9.
2. Maloney N, Vargas HD. Acute intestinal pseudo-obstruction (Ogilvie's syndrome). *Clin Colon Rectal Surg.* 2005 May;18(2):96-101.
3. Beattie GC, Peters RT, Guy S, et al. Computed tomography in the assessment of suspected large bowel obstruction. *ANZ J Surg.* 2007 Mar;77(3):160-5.
4. Aufort S, Charra L, Lesnik A, et al. Multidetector CT of bowel obstruction: value of post-processing. *Euro Radiol.* 2005 Nov;15(11):2323-9.
5. Chapman AH, McNamara M, Porter G. The acute contrast enema in suspected large bowel obstruction: value and technique. *Clin Radiol.* 1992 Oct;46(4):273-8.
6. DCCG Årsrapport 2016. http://dccg.dk/pdf/Aarsrapport_2016_dccg.pdf.
7. Iversen LH, Bülow S, Christensen IJ, et al. Postoperative medical complications are the main cause of early death after emergency surgery for colonic cancer. *Br J Surg.* 2008 Aug;95(8):1012-9.
8. Martinez-Santos C, Lobato RF, Fradejas JM, et al. Self-expandable stent before elective surgery vs. emergency surgery for the treatment of malignant colorectal obstructions: comparison of primary anastomosis and morbidity rates. *Dis Colon Rectum.* 2002 Mar;45(3):401-6.
9. Zorcolo L, Covotta L, Carlomagno N. Toward lowering morbidity, mortality, and stoma formation in emergency colorectal surgery: the role of specialization. *Dis Colon Rectum.* 2003 Nov;46(11):1461-7.
10. Karanicolas PJ, Dubois L, Colquhoun PH, et al. The more the better?: the impact of surgeon and hospital volume on in-hospital mortality following colorectal resection. *Ann Surg.* 2009 Jun;249(6):954-9.
11. Lenzi J, Lombardi R, Gori D, et al. Impact of procedure volumes and focused practice on short-term outcomes of elective and urgent colon cancer resection in Italy. *PLoS One.* 2013 May 16;8(5):e64245.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Litteraturliste - Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 1. november 2018	Gælder til:

12. Iversen LH, Harling H, Laurberg S, et al. Influence of caseload and surgical speciality on outcome following surgery for colorectal cancer: a review of evidence. Part 1: short-term outcome. *Colorectal Dis.* 2007 Jan;9(1):28-37.
13. Bilmoria KY, Phillips JD, Rock CE et al. Effect of surgeon training, specialization, and experience on outcomes for cancer surgery: a systematic review of the literature. *Ann Surg Oncol.* 2009 Jul;16(7):1799-808.
14. Biondo S, Kreisler E, Millan M. Impact of surgical specialization on emergency colorectal surgery outcomes. *Arch Surg.* 2010 Jan;145(1):79-86.
15. Archampong D, Borowski D, Wille-Jørgensen P. Workload and surgeon's specialty for outcome after colorectal cancer surgery. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012 Mar 14;3.
16. Allievi N, Ceresoli M, Fugazzola P, et al. Endoscopic Stenting as Bridge to Surgery versus Emergency Resection for Left-Sided Malignant Colorectal Obstruction: An Updated Meta-Analysis *International Journal of Surgical Oncology*, Volume 2017, Article ID 2863272
17. Huang X, Lv B, Zhang S, et al. Preoperative colonic stents versus emergency surgery for acute left-sided malignant colonicobstruction: a meta-analysis. *J Gastrointest Surg.* 2014 Mar;18(3):584-91.
18. Arezzo A, Passera R, Lo Secco G, et al Stent as bridge to surgery for left-sided malignant colonic obstruction reduces adverse events and stoma rate compared with emergency surgery: results of a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Gastrointest Endosc.* 2017 Sep;86(3):416-426. doi: 10.1016/j.gie.2017.03.1542. Review.
19. Cennamo V, Luigiano C, Coccolini F, et al. Meta-analysis of randomized trials comparing endoscopic stenting and surgical decompression for colorectal cancer obstruction. *Int J Colorectal Dis.* 2013 Jun;28(6):855-63.
20. Cirocchi R, Farinella E, Trastulli S, et al. Safety and efficacy of endoscopic colonic stenting as a bridge to surgery in the management of intestinal obstruction due to left colon and rectal cancer: a systematic review and metaanalysis. *Surg Oncol.* 2013 Mar;22(1):14-21.
21. Varadarajulu S, Roy A, Lopes T, et al. Endoscopic stenting versus surgical colostomy for the management of malignant colonic obstruction:comparison of hospital costs and clinical outcomes. *Surg Endosc.* 2011 Jul;25(7):2203-9.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Litteraturliste - Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 1. november 2018	Gælder til:

22. van Hooft JE, Fockens P, Marinelli AW, et al. Early closure of a multicenter randomized clinical trial of endoscopic stenting versus surgery for stage IV left-sided colorectal cancer. *Endoscopy.* 2008 Mar;40(3):184-91.
23. Tan CJ, Dasari BV, Gardiner K. Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials of self-expanding metallic stents as a bridge to surgery versus emergency surgery for malignant left-sided large bowel obstruction. *Br J Surg.* 2012 Apr;99(4):469-76.
24. Zhang Y, Shi J, Shi B, et al. Self-expanding metallic stent as a bridge to surgery versus emergency surgery for obstructive colorectal cancer: a metaanalysis. *Surg Endosc.* 2012 Jan;26(1):110-9.
25. Ho KS, Quah HM, Lim JF, et al. Endoscopic stenting and elective surgery versus emergency surgery for left-sided malignant colonic obstruction: a prospective randomized trial. *Int J Colorectal Dis.* 2012 Mar;27(3):355-62.
26. Pirlet IA, Slim K, Kwiatkowski F, et al. Emergency preoperative stenting versus surgery for acute left-sided malignant colonic obstruction: a multicenter randomized controlled trial. *Surg Endosc.* 2011 Jun;25(6):1814-21.
27. Tilney HS, Lovegrove RE, Purkayastha S, et al. Comparison of colonic stenting and open surgery for malignant large bowel obstruction. *Surg Endosc.* 2007 Feb;21(2):225-33.
28. Sagar J. Colorectal stents for the management of malignant colonic obstructions. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011 Nov 9;(11):CD007378.
29. Kobborg M, Broholm M, Frostberg E, et al. Short-term results of self-expanding metal stents for acute malignant large bowel obstruction. *Colorectal Dis.* 2017 Oct;19(10):O365-O371.
30. Datye A, Hersh J. Colonic perforation after stent placement for malignant colorectal obstruction--causes and contributing factors. *Minim Invasive Ther Allied Technol.* 2011 May;20(3):133-40.
31. Lee JG, Yoo KH, Kwon CI. Angular positioning of stent increases bowel perforation after self-expandable metal stent placement for malignantcolorectal obstruction. *Clin Endosc.* 2013 Jul;46(4):384-9.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Litteraturliste - Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 1. november 2018	Gælder til:

32. van Hooft JE, Bemelman W, Oldenburg B, et al. Colonic stenting versus emergency surgery for acute left-sided malignant colonic obstruction: a multicentre randomised trial Lancet Oncol 2011; 12: 344–52
33. Lee JH, Yoon JY, Park SJ. The learning curve for colorectal stent insertion for the treatment of malignant colorectal obstruction. Gut Liver. 2012 Jul;6(3):328-33.
34. L. H. Iversen, M. Kratmann, M. Bøje, et al. Self-expanding metallic stents as bridge to surgery in obstructing colorectal cancer. Br J Surg. 2011 Feb;98(2):275-81.
35. Amelung FJ, Draaisma WA, Consten ECJ, et al. Self-expandable metal stent placement versus emergency resection for malignant proximal colon obstructions. Surg Endosc. 2017 Nov;31(11):4532-4541.
36. Amelung FJ, de Beaufort HW, Siersema PD, et al. Emergency resection versus bridge to surgery with stenting in patients with acute right-sided colonic obstruction: a systematic review focusing on mortality and morbidity rates. Int J Colorectal Dis. 2015 Sep;30(9):1147-55. Review.
37. Kronborg O. Acute obstruction from tumor in the left colon without spread. A randomized trial of emergency colostomy versus resection. Int J Colorectal Dis. 1995;10(1):1-5.
38. Amelung FJ, Mulder CL, Verheijen PM, et al. Acute resection versus bridge to surgery with diverting colostomy for patients with acute malignant left sided colonic obstruction: Systematic review and meta-analysis. Surg Oncol. 2015 Dec;24(4):313-21.
39. Amelung F, Borg F, Consten F, et al. Deviating colostomy construction versus stent placement as bridge to surgery for malignant left-sided colonic obstruction. Surg Endosc (2016) 30:5345–5355
40. Trompetas V. Emergency management of malignant acute left-sided colonic obstruction. Ann R Coll Surg Engl. 2008 Apr;90(3):181-6.
41. Chéreau N, Lefevre JH, Lefrancois M, et al. Management of malignant left colonic obstruction: is an initial temporary colostomy followed by surgical resection a better option? Colorectal Dis. 2013 Jul 2.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Litteraturliste - Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 1. november 2018	Gælder til:

42. Ansaloni L, Andersson RE, Bazzoli F. Guidelenines in the management of obstructing cancer of the left colon: consensus conference of the world society of emergency surgery (WSES) and peritoneum and surgery (PnS) society. *World J Emerg Surg.* 2010 Dec 28;5:29.
43. De Salvo GL, Gava C, Pucciarelli S, et al. Curative surgery for obstruction from primary left colorectal carcinoma: primary or staged resection? *Cochrane Database Syst Rev.* 2004; (2):CD002101.
44. Lee YM, Law WL, Chu KW, et al. Emergency surgery for obstructing colorectal cancers: a comparison between right-sided and left-sided lesions. *J Visc Surg.* 2012 Feb;149(1):e3-e10.
45. Hsu TC. Comparison of one-stage resection and anastomosis of acute complete obstruction of left and right colon. *Am J Surg.* 2005 Apr;189(4):384-7.
46. Kam MH, Tang CL, Chan E, et al. Systematic review of intraoperative colonic irrigation vs. manual decompression in obstructed left-sided colorectal emergencies. *Int J Colorectal Dis.* 2009 Sep;24(9):1031-7.
47. Gainant A. Emergency management of acute colonic cancer obstruction. *J Visc Surg.* 2012 Feb;149(1):e3-e10.
48. Hennekinne-Mucci S, Tuech JJ, Bréhant O. Emergency subtotal/total colectomy in the management of obstructed left colon carcinoma. *Int J Colorectal Dis.* 2006 Sep;21(6):538-41.
49. Käser SA, Glauser PM, Künzli B, et al. Subtotal colectomy for malignant left-sided colon obstruction is associated with a lower anastomotic leak rate than segmental colectomy. *Anticancer Res.* 2012 Aug;32(8):3501-5.
50. The SCOTIA Study Group. Subtotal Colectomy versus On-table Irrigation and Anastomosis. Single-stage treatment for malignant left-sided colonic obstruction: a prospective randomized clinical trial comparing subtotal colectomy with segmental resection following intraoperative irrigation. *Br J Surg.* 1995 Dec;82(12):1622-7.
51. Dansk Colorectal Cancer Database Årsrapport 2012, S.71. https://dccg.dk/wp-content/uploads/2017/10/Aarsrapport_2012.pdf
52. Avlund TH, Erichsen R, Ravn S, et al. The prognostic impact of bowel perforation following self-expanding metal stent as a bridge to surgery in colorectal cancer obstruction. *Surg Endosc.* 2018 Jan;32(1):328-336.

DCCG.dk's NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER			
Litteraturliste - Colonileus			
Forfattere: UL, TA	Version:	Gælder fra: 1. november 2018	Gælder til:

53. Sloothaak DA, van den Berg MW, Dijkgraaf MG, et al; collaborative Dutch Stent-In study group. Onological outcome of malignant colonic obstruction in the Dutch Stent-In 2 trial. *Br J Surg.* 2014 Dec;101(13):1751-7.
54. Arezzo A, Balague C, Targarona E, et al. Colonic stenting as a bridge to surgery versus emergency surgery for malignant colonic obstruction: results of a multicentre randomised controlled trial (ESCO trial). *Surg Endosc.* 2017 Aug;31(8):3297-3305.
55. Verstockt B, Van Driessche A, De Man M, et al. Ten-year survival after endoscopic stent placement as a bridge to surgery in obstructing colon cancer. *Gastrointest Endosc.* 2017 Jun 1. pii: S0016-5107(17)31986-7.
56. Erichsen R, Horváth-Puhó E, Jacobsen JB, et al. Long-term mortality and recurrence after colorectal cancer surgery with preoperative stenting: a Danish nationwide cohort study. *Endoscopy.* 2015 Jun;47(6):517-24.
57. Matsuda A, Miyashita M, Matsumoto S, et al. Comparison of Long-Term Outcomes of Colonic Stent as “Bridge to Surgery” and Emergency Surgery for Malignant Large-Bowel Obstruction: A Meta-Analysis *Ann Surg Oncol* (2015) 22:497–504
58. Meisner S, González-Huix F, Vandervoort JG et al. Self-Expanding Metal Stenting for Palliation of Patients with Malignant Colonic Obstruction: Effectiveness and Efficacy on 255 Patients with 12-Month's Follow-up. *Gastroenterol Res Pract.* 2012;2012:296347.
59. Colonic perforation with intraluminal stents and bevacizumab in advanced colorectal cancer: retrospective case series and literature review. Imbulgoda A, MacLean A, Heine J, Drolet S, Vickers MM. *Can J Surg.* 2015 Jun;58(3):167-71. Review.
60. De Ceglie A, Filiberti R, Baron TH, et al. A meta-analysis of endoscopic stenting as bridge to surgery versus emergency surgery for left-sided colorectal cancer obstruction. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2013 Nov;88(2):387-403.
61. Abelson JS, Yeo HL, Mao J et al (2017) Longterm postprocedural outcomes of palliative emergency stenting vs stoma in malignant large-bowel obstruction. *JAMA Surg* 152:429–435
62. Young CJ, De-Loyde KJ, Young JM, et al. Improving quality of life for people with incurable large-bowel obstruction: randomized control trial of colonic stent insertion. *Dis Colon Rectum* 2015,58(9):838–849