

DCCG'S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER		
<b>Single-incision laparoskopisk rectumresektion</b>		
Forfattere: ILo	Gælder fra: 1. januar 2013	Gælder til:

## Rekommandationer

- SILS rectum-resektioner kan mht. korttidsresultater udføres tilfredsstillende hos selekterede ikke-overvægtige patienter med tumor < 4cm, hvis udført af rutineret laparoskopisk kirurg. Skal altid foregå i protokolleret regi. C

SILS ved rectum-resektion er først beskrevet indenfor de seneste år og publicerede data udgøres overvejende af kasuistikker og mindre hovedsageligt non-komparative serier med heterogene indikationer. Data viser foreløbigt, at SILS rectum-resektioner kan udføres af rutinerede laparoskopiske kirurger på meget selekterede ikke overvægtige patienter med små tumores vurderet ved MR til < 4 cm og tumorstadiet  $\leq$  T3. Konverteringsrater, postoperative komplikationer og korttids-onkologiske resultater er sammenlignelige med resultater opnået ved konventionel laparoskopisk teknik, men data-rapportering er sparsom, specielt hvad angår onkologiske data. Der foreligger ingen langtidsresultater (*evidens 4*) (1-4). Single-incision rectum-resektioner bør indtil videre udelukkede foregå i protokolleret regi.