

MR rektum – Re-stadig efter radiokemoterapi

Komplet response med normaliseret tarmvæg (ja/nej):

Fibrøs vægfortykkelse uden rest tumor (ja/nej):

Rest tumor og/eller øget signal på DWI(ja/nej):

Afstand fra ydre analåbning til tumors nedre pol (cm):

Afstand fra anorektal overgang til tumors nedre pol (cm):

Tumor længde (cm): Tumor bredde:

ycT- stadie (ycT0,T1,T2,T3a,T3b,T3c,T3d,T4):

Ved T4 angiv naboorgan, hvor der er indvækst (peritoneum,uterus ect):

Sphincter indvækst (ja/nej):

Hvis ja (interne sphincter/intersphincterisk plan/ekstern sphincter):

Højde på sphincter indvækst (øvre-, midterste- eller nederste 1/3):

Korteste afstand mellem tumor og MRF i mm: og kl:

Tumors anteriore øvre kant: under omslagsfolden (ja/nej):

ycN- stadie (ycN0 = ingen lymfeknuder eller < 5mm):

Antal suspekter(>=5mm) i mesorektum:

Antal suspekter(>=5mm) ekstramesorektalt:

Tumor deposits i mesorektum (ja/nej): Hvis ja antal:

Ekstramural vaskulær invasion (ja/nej):

Konklusion(yc stadie):