

DCCG'S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER		
<b>Svarafgivelse til rekvirent</b>		
Forfattere: DCCG	Gælder fra: 1. januar 2013	Gælder til:

Svaret omfatter samlet makroskopisk og mikroskopisk vurdering. Det udformes på en sådan måde, at følgende fremgår:

- Stadium og risikofaktorer som indicerer yderligere behandling
- Parametre som skal indberettes til DCCG's database

Svaret skal derfor som minimum indeholde følgende oplysninger:

1. Tumors lokalisation
2. Histologisk type
3. TRG ved neoadjuverende behandling
4. Mismatch repair status bedømt ved immunhistokemi (y)pT
5. Dybdevækst under tunica muscularis for (y)pT3 og (y)pT4 tumorer
6. Gennemvækst af peritoneum
7. Antal lymfeknuder
8. Antal lymfeknuder med metastaser
9. (y)pV
10. Perineural invasion
11. Tumorsatellitter (hvis det er det eneste)
12. Resektionsplaner
  - a. Mesokolisk segment
  - b. Mesorektalt segment
  - c. Sphinkterisk segment
13. Afstand fra tumor til karunderbindingssted (ligaturhøjde) ved colon-resektater
14. Afstand til ikke-peritonealiserede resektionsflade (colon og rectum)
15. Nedfrosset materiale
16. Radikalitet

Følgende parametre indberettes ikke til databasen, men kan være af værdi i MDT-sammenhæng:

1. Afstanden fra nærmeste tarmvæg til karunderbindingsstedet ved coloncancer resektater.
2. Afstand til ikke-peritonealiserede resektionsflade (Colon)
3. Resektionsplan for sphinkterisk segment for APR-resektater

Diagnosekodning til patobank foretages i henhold til retningslinierne fra DPAS Informatikudvalg [http://www.dccg.dk/06\\_Downloads/kodning\\_2011.pdf](http://www.dccg.dk/06_Downloads/kodning_2011.pdf)